

Cuadro 1. Insectos fitófagos asociados al cultivo de la quinua (ordenados en base a la mayor frecuencia de especies por orden)

ORDEN	FAMILIA	GÉNERO	ESPECIE
Lepidóptera	Gelechiidae	<i>Eurysacca</i>	<i>E. melanocampta</i> (Meyrick)
			<i>E. quinoae</i> Povolný
	Geometridae	<i>Perizoma</i>	<i>P. sordescens</i> Dognin
		<i>Agrotis</i>	<i>A. ipsilon</i> (Hufnagel)
	Noctuidae	<i>Copitarsia</i>	<i>C. decolora</i> Guenée
			<i>C. incommoda</i> Walker
			<i>C. turbata</i> Herrich – Schaeffer *
		<i>Dargida</i>	<i>D. graminivora</i> Walker
			<i>D. acanthus</i> Herrich - Schaeffer
		<i>Feltia</i>	<i>F. experta</i> Walker
		<i>Helicoverpa</i>	<i>H. quinoa</i>
			<i>H. titicacae</i> Hardwick
			<i>H. atacamae</i>
		<i>Heliothis</i>	<i>H. zea</i> (Boddie)
			<i>H. titicaquensis</i>
		<i>Peridroma</i>	<i>P. saucia</i> (Hübner)
		<i>Pseudaletia</i>	<i>P. unipunctata</i> Haworth
			<i>P. interrupta</i> Maassen
		<i>Spodoptera</i>	<i>S. eridania</i> (Cramer)
			<i>S. frugiperda</i> (J. E. Smith)
	Pyralidae	<i>Herpetogramma</i>	<i>H. bipunctalis</i> (Fabricius)
		<i>Spoladea</i>	<i>S. recurvalis</i> (Fabricius)
		<i>Pachyzancla</i>	<i>Pachyzancla</i> sp.
		<i>Hymenia</i>	<i>Hymenia</i> sp.
Coleóptera	Bruchidae	<i>Acanthoscelides</i>	<i>A. diasanus</i> (Pic)
	Chrysomelidae	<i>Acalymma</i>	<i>A. demissa</i>
		<i>Calligrapha</i>	<i>C. curvilinear</i> Stal
		<i>Diabrotica</i>	<i>Diabrotica</i> spp.
			<i>Diabrotica specios</i>
		<i>Epitrix</i>	<i>E. subcrinita</i> LeConte,
			<i>E. yanazara</i> Bechyne
	Curculionidae	<i>Adioristus</i>	<i>Adioristus</i> sp.

*Sinónimo de *C. decolora*