

- Simmons, RB; Pogue, MG. 2004. Redescription of two often-confused noctuid pests, *Copitarsia decolora* and *Copitarsia incommoda* (Lepidoptera: Noctuidae: Cucullinae). Ann. Entomol. Soc. Am. 97:1159-1164.
- Valoy, M; Bruno, M; Prado, F; González, J. 2011. Insectos asociados a un cultivo de quinoa en Amaicha del Valle, Tucumán, AR. Acta zoológica Lilloana 55 (1): 16-22.
- Vélez, R. 1997. Plagas agrícolas de impacto económico en Colombia: bionomía y manejo integrado. Medellín: Universidad de Antioquia. 68 (1): 112-116.
- Whitfield, J; Rasmussen, C; Arias Penna, C. 2011. Review of the New World Genus *Venanus* (Hymenoptera: Braconidae: Microgastrinae), With a New Key and Descriptions of Three New Reared Neotropical Species. Ann. Entomol. Soc. Am. 104(6): 1119 - 1127.
- Yabar, E; Baca, B. 1981. Algunos lepidópteros que atacan al tarwi (*Lupinus mutabilis*) en el Cusco. Rev. Per. Ent. 24(1): 81-85.
- Zanabria, E; Mujica, A. 1977. Evaluación de insectos plaga de la quinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) en el departamento de Puno. In Convención Nacional de Entomología, (XX, 1977, Arequipa, PE). p. 36-37.
- Zanabria, E; Banegas, M. 1997. Entomología económica sostenible. Puno, PE. Universidad Nacional del Altiplano del Perú.