


OIDIO o "MAL DE CENIZA" DEL DURAZNO

El oídio es causado por el hongo *Sphaerotheca pannosa*. Es una enfermedad que ataca a hojas y frutos, causando la baja calidad de los frutos



Provoca deformación de hojas y brotes

Reduce el tamaño y la formación de órganos florales

Puntos y manchas blancas

Reduce la fotosíntesis

Ataca a brotes tiernos, hojas en desarrollo y frutos.


ESTRATEGIA DE CONTROL

CULTURAL

PRIMAVERA




- Fertilización a base de **nitrógeno, fósforo y potasio**.




- Eliminar malezas (hospederos alternos) **con daño de Oídio** antes de fumigar.

INVIERNO



- Poda equilibrada con cortes y **quemar brotes afectados**.



- Tener **buena exposición solar**, ventilación y altura.

QUÍMICO




- Son necesarias **tres aplicaciones con fungicidas** (usar diferentes productos por aplicación para no crear resistencia).




- Después de la poda **aplicar caldo sulfocálcico** con cobertura total.

BIOLÓGICO




- Son necesarias **cinco aplicaciones con bioinsumos** con **Bacterial Mix y Vigor Top Plus**, para **estimular el desarrollo foliar y resistencia**



POST-COSECHA

- Aplicar bioinsumos como el **Bacterial Mix**, la cobertura debe ser total, para reducir la enfermedadl.

VIGOR TOP PLUS
PROMUEVE EL CRECIMIENTO
Aplicar en una dosis de 2 lt/ha



BACTERIAL MIX
DE USO PREVENTIVO
Aplicar en una dosis de 2 lt/ha.

www.proinpa.org