

OIDIO o "MAL DE CENIZA" DE LA VID

El oídio de la vid, es una enfermedad fúngica, causada por el *Uncinula necator*, su manifestación más notoria son las manchas blancas de aspecto polvoriento. Detiene el crecimiento de los frutos. Se desarrolla en condiciones climáticas de baja precipitación y elevada temperatura.

Grietas en la piel

Bayas cubiertas por la ceniza,

Manchas blancas

Rugosidad en la hoja

Brotos débiles


Hojas amarilladas

ESTRATEGIA DE CONTROL DE OIDIO PARA LA VID

PRIMAVERA

INVIERNO

CULTURAL



- **Limpieza del cultivo:** eliminación de las bayas o racimos que estén contaminados



- **Podar en verde** para controlar el desarrollo de la planta y la cantidad de Yemas



- **Raleo:** eliminación de algunos racimos y bayas, con el objetivo de mejorar la calidad de la fruta

QUÍMICO



- Aplicar **azufre como fungicida preventivo** cada **siete a diez días**, a partir del brote.



- Después de la poda **aplicar caldo sulfocálcico**, cobertura total.



- Son necesarias **tres aplicaciones o más con fungicidas**, se debe **usar diferentes productos para no generar resistencia**

BIOLÓGICO




- Realizar cinco o más aplicaciones con productos biológicos con **Bacterial Mix, y VigorTop Plus**, cobertura total.



- **Post-cosecha:** Un mes después de la cosecha, aplicar bioinsumos como el **Bacterial Mix** para bajar el inóculo

VIGOR TOP PLUS
PROMUEVE EL CRECIMIENTO
Aplicar en una dosis de 2 lt/ha



BACTERIAL MIX
DE USO PREVENTIVO
Aplicar en una dosis de 2 lt/ha.