



LA ARAÑUELA DEL DURAZNO

Es conocido como el ácaro rojo, mide entre 0,2 a 0,5 mm. Se agrupa en el envés de las hojas. Prefiere ubicarse debajo de las hojas para reducir la exposición a la radiación ultravioleta.



Puntos amarillos o rojizos



Manchas oscuras en los frutos




Manchas amarillas

Abultamiento en las hojas



Defoliación



Telarañas

ESTRATEGIA DE CONTROL DE LA ARAÑUELA EN EL DURAZNO

PRIMAVERA

INVIERNO

CULTURAL



- Seleccionar **variedades de durazno resistentes** a la arañuela.



- **Manejo de suelo** con buena estructura y fertilidad.



- **Poda de durazno** y hacer una **limpieza de la parcela**.



- **Riego:** Evitar el riego excesivo y asegurarse de que el **suelo** tenga **buen drenaje**.

QUÍMICO



- **Controlar** la población, **con** ingredientes activos: **Abamectina, Cyflumetofen y Clofentezine.**



- En **casos graves** usar: **Imidacloprid (Confidor) y Thiametoxam (Actara).**

BIOLÓGICO




- Aplique tres veces productos biológicos. Se recomienda usar **Bio Max** cobertura total.



- Al inicio de la campaña use el **Acaritop** como preventivo **combinado** con un fungicida como el **Bacterial Mix**.

BIO MAX
DE USO PREVENTIVO
Aplicar en una dosis de 1 lt/ha.



BACTERIAL MIX
DE USO PREVENTIVO
Aplicar en una dosis de 2 lt/ha.