

MOSCA DE LA FRUTA DEL MANZANO

Es conocida como *Ceratitis capitata*, es una pequeña mosca con colores moteados y en su dorso tiene un símbolo similar a una calavera. Llega a poner de 10 a 15 huevos en 4 días aproximadamente



Manchas marrones



Pudrición



Orificios de salida



Hundimiento y decoloración



Picaduras

ESTRATEGIA DE CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA

PRIMAVERA

INVIERNO

CULTURAL



- Eliminación de frutos caídos para reducir la reproducción de la mosca



- Manejo de riego adecuado para que el manzano no se estrese por falta de agua



- Barbecho y rastreo para eliminar las pupas y gusanos



- Usar de trampas alimenticias y sexuales para monitorear la plaga

QUÍMICO



- Usar insecticidas específicos haciendo rotación de los grupos químicos.
- Se debe desarrollar la captura de la mosca para controlar la funcionalidad del producto químico.

BIOLÓGICO



- En primavera, se recomienda tres aplicaciones con producto biológico **Bío Max**, además de feromonas alimenticias para monitoreo.



- En el cuajado del fruto usar feromonas sexuales **Fero Fruit** como preventivo.
- Se sugiere colocar entre **16 y 20 trampas por ha** y 4 para el monitoreo.



BACTERIAL MIX
DE USO PREVENTIVO
Aplicar en una dosis de 2 lt/ha.